

# 鸦胆子油乳口服治疗食管癌吞咽困难 16 例

312500 浙江省新昌县中医院 俞春生

**关键词** 食管癌 吞咽困难 鸦胆子油乳

吞咽困难是食管癌的主要症状,严重影响患者的生活质量。自 2001 年以来,笔者应用鸦胆子油乳口服治疗食管癌吞咽困难 16 例,并与本品静滴治疗的 16 例进行对照,发现口服组疗效更好。现报告如下。

## 1 一般资料

本组 32 例均为住院病人,均有不同程度的吞咽困难症状,并经胃镜及病理学确诊为食管癌,因失去治疗时机或不愿手术、放疗和化疗的患者。其中男 22 例,女 10 例;年龄:42~79 岁,平均 65.45 岁;病变部位:食管上段 2 例,中段 19 例,下段 11 例;吞咽困难分级:1 级(能进半流液)11 例,2 级(仅能进流食)18 例,3 级(不能进水或唾液)3 例。随机分为鸦胆子油乳口服组和静滴组各 16 例。

## 2 治疗方法

口服组:采用鸦胆子油乳口服,每次 10ml,每日 3 次。静滴组:采用鸦胆子油乳静脉滴注,每次 30ml 加入 5% 葡萄糖注射液 500ml 中,每日 1 次。两组均行常规支持疗法。治疗 3 周为 1 疗程。

## 3 治疗结果

3.1 疗效标准:患者的吞咽困难症状消失或减轻 1 级以上者,为有效;患者的吞咽困难症状未改善或减轻不足 1 级者,为无效。

3.2 治疗结果:经上法治疗 1 疗程后,两组吞咽困难改善情况见表 1。从表 1 可见,口服组的疗效较静滴组为优。

表 1 两组吞咽困难改善情况 (n=16)

组别	有效	无效	有效率 (%)
口服组	14	2	87.50*
静滴组	10	6	62.50

注:与静滴组比较, \* $P < 0.05$

## 4 体会

鸦胆子油乳是从中药鸦胆子提炼而成,现代药理研究其具有较好的抗癌作用,为细胞周期非特异性抗癌药。食管癌恶性狭窄或梗阻是影响患者生活质量及生存期的主要因素,患者最迫切的要求是缓解吞咽困难症状。鸦胆子油乳一般用静滴治疗,笔者通过改变其用药途径,采用口服治疗食管癌,发现能明显改善患者的吞咽困难症状。但是其作用机制以及对肿瘤的总疗效、中位生存期的影响,有待进一步研究。

收稿日期 2004-05-11

## 旋覆代赭汤加味治疗化疗呃逆

310008 浙江省杭州市红十字会医院

张敏

陈某某,男性,52 岁。因患肝癌多脏器转移,化疗后出现连续呃逆 6 天,经西药、针灸等治疗无效。诊见昼夜呃逆频频,口干,咽痛,有少量痰涎,消瘦。舌质红、苔黄少津,脉虚弦。此为药毒伤胃,气虚痰阻,胃气上逆,治疗拟益胃化痰降逆,方用旋覆代赭汤加味。处方:旋覆梗、代赭石(先煎)、冬凌草各 20g,制半夏、麦冬、玉竹各 15g,生晒参、干姜、白蔻仁、甘草各 5g。每日 1 剂,日服 3 次。2 日后呃逆止。方中旋覆花消痰理气、软坚散结,代赭石重镇降逆,生姜、半夏和胃化痰,人参、甘草、大枣和脾养胃,安定中焦;又因胃津不足,而口干舌燥咽痛,宜润燥通幽,故加用麦冬、玉竹以滋阴润燥;再加白蔻仁开利胸脘,冬凌草清热解毒、活血止痛。全方与化疗所致呕吐等胃肠道反应之证正相吻合,故疗效颇佳。

收稿日期 2004-04-30