

补中益气汤治疗直肠癌Dixon术后便次增多30例临床观察

廖九光¹ 薛 霁²

130012吉林省肿瘤医院¹

130041吉林大学第二医院²

近年来, 由于对直肠癌淋巴转移途径的进一步认识及肠吻合器普遍运用, 对于距肛缘5cm以上的直肠癌, 目前多行Dixon术(经腹直肠癌切除术), 保留肛门, 极大地提高了患者术后生活质量。但由于吻合口位于齿状线附近, 在手术后的一段时间内病人出现便次增多、排便控制功能较差。笔者运用补中益气汤治疗Dixon术后便次增多30例, 与未行中医治疗的30例作对比观察, 取得较好疗效, 现报告如下。

资料与方法

60例患者术前均诊断为直肠癌, 行Dixon术, 术后3天均不同程度存在大便次数增多, 每例患者便次均 ≥ 4 次/日。随机分治疗组30例和对照组30例。治疗组男21例, 女9例; 年龄33~73岁, 平均50.4岁; 大便4~15次/日, 平均7.3次/日, 大便失控6例。对照组男19例, 女11例; 年龄36~75岁, 平均

51.6岁; 大便4~13次/日, 平均6.9次/日, 大便失控5例。两组年龄及便次比较, $P > 0.05$, 具有可比性。

诊断标准 大便 ≥ 3 次/日为便次增多。

治疗方法 对照组: 术后常规抗感染、支持治疗。治疗组: 在抗感染、支持治疗基础上服补中益气汤(黄芪30g, 炙甘草10g, 党参25g, 当归15g, 白术15g, 陈皮10g, 升麻10g, 柴胡10g), 每日1剂, 水煎2次, 取汁300ml, 早晚温服, 10剂为1个疗程。

疗效标准 参考正常人便次、便质及临床效果拟定。①治愈: 大便 ≤ 2 次/日, 大便成形, 能自控; ②显效: 大便3次/日, 大便成形, 能自控; ③有效: 大便3~4次/日, 大便稀, 能自控; ④无效: 大便 > 4 次/日, 便溏或大便失控。

结果 治疗组30例患者服药1~2个疗程不等, 平均1.3个疗程。治愈12例(40%), 显效10例(33.3%), 有效6例(20%), 无效2例, 总有效率93.3%。对照组治愈2例(6.7%), 显效8例(26.7%), 有效10例(33.3%), 无效10例, 总有效率66.7%。两组疗效比较, 差异有显著性($P < 0.05$)。

典型病例 患者, 男, 49岁。因直肠低分化腺癌(距肛缘7cm)于2003年

5月27日行直肠癌根治术(Dixon术式)。术后第2天肛门恢复排气, 第3天开始出现便溏、大便失控, 当天即大便10次, 每次量少, 伴体倦乏力、汗出, 无发热、咳嗽、呕吐, 神志清楚、精神欠佳, 心肺无异常体征, 腹软, 切口无红肿, 舌质淡、苔薄白、脉沉弱。证属中气不足, 气虚下陷。在抗感染、支持治疗基础上加服补中益气汤, 服药5剂后, 大便已能自控, 便次明显减少, 服10剂后, 大便成形, 日行2次, 自我感觉良好。

讨论

直肠有排便、吸收和分泌功能。Dixon直肠癌根治术切除了绝大部分直肠, 或多或少损伤支配肛管括约肌的神经, 导致术后便次增多, 甚至失控。随着时间延长(3~6个月), 症状会逐渐好转。本病中医辨证当属中气下陷, 故用补中益气汤治疗能够有效缩短术后恢复时间, 提高治疗效果。

补中益气汤具有补中益气、升阳举陷之功效, 常用于治疗脱肛、久泻、子宫下垂等症。方中黄芪、人参、白术、炙甘草补中益气; 升麻、柴胡升举清阳。经临床验证, 效果较好, 值得进一步观察使用。

乐频清珍黄丸治疗小儿流行性腮腺炎疗效观察

李 静 王新红

264300山东省荣成市人民医院儿科

流行性腮腺炎为小儿时期常见的

多发病, 是由腮腺炎病毒感染引起的急性全身性疾病。目前尚无有效的抗病毒药物。我科于2001年12月~2004年12月, 采用中成药乐频清珍黄丸治疗小儿流行性腮腺炎102例, 同时

以利巴韦林治疗60例作为对照, 现报告如下。

资料与方法

流行性腮腺炎患儿共162例, 其中

曲泽穴放血治疗急性胃肠炎30例疗效观察

靳中秀 史玉蓉

044000山西运城盐湖区陶村镇辛曹村卫生所

近年来,我们采用曲泽穴放血治疗急性胃肠炎,取得良好疗效,现报告如下。

资料与方法

患者以恶心、呕吐、腹痛、腹泻为主要症状,并排除阑尾炎、菌痢等

其他疾病,诊断为急性胃肠炎,共30例患者,男17例,女13例,年龄16~50岁,病程为数小时内。

治疗方法 在曲泽穴上下推按,使瘀血积聚,然后在穴位近心端扎紧止血带,使静脉暴露的更明显。常规消毒后,用三棱针在曲泽穴部位小静脉点刺,深约2分,立即出针,轻轻挤压针孔周围,使出血数十滴,最后按压针孔。

结果 恶心、呕吐、腹痛、腹泻症状消失者18例,症状减轻者5例,无效者7例。无效的7例,均伴有发热或

黏液便,口服抗生素治愈。

讨论

放血疗法又称刺血疗法、刺络疗法,是以针刺某些穴位或体表小静脉而放出少量血液的疗法。具有活血通络、解毒泄热、止痉、止吐、消肿止痛等功效。适用于吐、泻、腹痛、热、痉等疾病。我们采用曲泽穴放血治疗急性胃肠炎,简便易行,疗效较好,但对伴有发热及黏液便患者,需联合抗生素治疗。

男84例,女78例;年龄2~14岁,平均7.8岁。全部病例均符合下列诊断标准:①当地有流行病史及发病前有腮腺炎接触史;②典型的临床表现包括腮腺或颌下腺肿大,咀嚼时疼痛,腮腺管口红肿,体温中度增高;③实验室检查血常规白细胞总数大多正常,淋巴细胞相对增多,血清及尿淀粉酶增高。其中5例并发腮腺炎脑膜炎,出现头痛、呕吐、颈项强直等症状。

方法 采用随机分组对照观察法,将162例患儿分成治疗组102例和对照组60例。两组在年龄、性别、病情程度方面差异无显著性($P>0.05$)。

治疗方法 治疗组给予中成药乐频清珍黄丸治疗,口服剂量: <5岁0.2g, 3次/日; 5~14岁0.4g, 3次/日。同时取药粉加米醋(或凉开水)调成糊状,每日敷于腮腺或颌下腺肿胀处。对照组给予利巴韦林10~15ml/(kg·日)肌注或静滴治疗。全部病例对症治疗相同,如适当休息、补充水分及营养、禁食酸性食物等。有并发症者给予相应处理。

疗效判定标准 ①痊愈:治疗5天,腺体肿胀完全消退,咀嚼无痛感,体温正常;②显效:治疗5天,腺体肿胀减轻,咀嚼时痛感减轻,体温接近正常;③无效:治疗5天,腺体仍肿胀,并且咀嚼时疼痛感未减轻,体温未降至正常。

结果 治疗观察5天后,治疗组治愈87例,好转8例,无效7例,总有效率93.1%;对照组治愈31例,好转5例,无效10例,总有效率78.3%;经检验 $P<0.01$,差异有非常显著性。

讨论

乐频清珍黄丸是以中药牛黄、珍珠、三七、黄芩、猪胆汁及薄荷油等药物组成。牛黄、黄芩具有清热解毒、熄风止惊、化痰开窍、燥湿止血等作用;黄芩所含的黄芩苷能抑制过敏性浮肿及炎症,抑制过敏性炎症的释放并有广谱抗菌作用;三七具有散瘀止血、消肿定痛的作用,可以缩短凝血酶原时间,降低毛细血管通透性,增加外周血管的血流量,达到止

血化瘀的目的;珍珠可平肝潜阳,镇静安神养阴,并增加清热解毒之功;冰片能开窍醒神,散郁火,清热解毒;猪胆汁清热、润燥解毒;冰片与猪胆汁对肿痛、热毒的消除具有促进作用;薄荷油疏风散热,增强主药之功效,并进一步消除体内遗留火热之毒。

流行性腮腺炎中医称“痄腮”,系感染风温毒邪所致。毒邪通过飞沫侵入机体,壅结于少阳经络,郁结不散。故采用乐频清珍黄丸治疗能达到清热解毒、消肿散结之目的。从现代医学角度讲,本病为腮腺炎病毒感染所致,以往应用利巴韦林治疗有许多不良反应,有时可引起贫血、白细胞减少等造血系统变化。动物实验证明该药有致畸毒性。

通过临床观察,我们体会到应用乐频清珍黄丸治疗流行性腮腺炎,退热快,缩短病程,无明显不良反应,且用药方便,是治疗流行性腮腺炎的理想药物。